



TRAVE

IME	OPIS	SLIKA
VISOKA PAHOVKA <i>(Arrhenatherum elatius)</i>	Je 3–5-letna trava, zelo zgodnja v razvoju, odporna je proti suši, ne prenaša dobro ostrejših zimskih razmer, ustrezajo ji srednje težka, zračna in sušna tla.	 <p>KNÖLHAVRE, ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) M. ET K.</p>
PASJA TRAVA <i>(Dactylis glomerata)</i>	Spada med naše najbolj kakovostne vrste visokih trav. Dobro uspeva v različnih rastnih pogojih in je med vsemi gospodarsko pomembnimi travami najbolj odporna proti suši.	 <p>HUNDÄXING, DACTYLIS GLOMERATA L.</p>
TRAVNIŠKA BILNICA (<i>Festuca pratensis</i>)	Je 8–10-letna visoka vrsta trave, bogata z listi, pri nas ena najbolj kakovostnih vrst trav, ni pa konkurenčna z ostalimi rastlinami, dobro prenaša zimske razmere in vlažnejša tla. Dobro prenaša košnjo in pašo.	 <p>ÄNGSSVINGEL, FESTUCA PRATENSIS Huds.</p>

TRAVNIŠKI MAČJI REP (<i>Phleum pratense</i>)	<p>Je 4–6-letna trava, ki raste v velikih, redkih šopih in ima na dnu čebulasto odebelitev. Je pozna vrsta trave, ki polne pridelke daje od 2. leta dalje. To je trava vlažnejših področij, ki dobro prenaša pašo in košnjo.</p>	 <p style="text-align: center;">TIMOTÉJ. PHLEUM PRATENSE L.</p>
GOLA STOKLASA (<i>Bromus inermis</i>)	<p>Razrašča se v podolgovato raztegnjeno obliko šopa, hitro raste in se po vsaki rabi obrašča. Primerna je za pašo in košnjo. Večletna trava, ki dobro prenaša ostre zime in suho podnebje.</p>	
TRPEŽNA ALI ANGLEŠKA LJULJKA (<i>Lolium perenne</i>)	<p>Je 3–4-letna trava hitre rasti in zgodnjega razvoja, ki odlično prenaša pašo in košnjo. Najbolje uspeva na svežih, težkih in vlažnih tleh, ki so dobro preskrbljena s hranili. Občutljiva je na nizke temperature in dolgotrajno snežno odejo.</p>	 <p style="text-align: center;">NONREFE. LOLIUM PERENNE L.</p>

RDEČA BILNICA <i>(Festuca rubra)</i>	<p>Zanjo je značilna blazinasta razrast. Uspeva predvsem na manj zahtevnih tleh, kjer ni več ugodnih pogojev za intenzivne vrste trav. Za krmo ni posebno kakovostna, toda zaradi gostega razraščanja je pomembna za zasnov pašnikov. Zlasti je primerna za paš drobnice in konj. Uspeva na suhih travnikih, razvija se počasi, poln pridelek da šele v 3. ali 4. letu.</p>	 <p>ANGSSVINGEL, FESTUCA PRATENSIS Huds.</p>
TRAVNIŠKA LATOVKA <i>(Poa pratensis)</i>	<p>Uspeva na lažjih tleh in sušnih področjih. Sicer se dobro prilagaja različnim rastnim razmeram in je zato zelo razširjena na manj intenzivnih travnikih in pašnikih. Najbolje uspeva na lažjih in srednje težkih tleh. Ker je počasne rasti, poln pridelek doseže šele v 4. ali 5 letu rasti.</p>	 <p>ÄNGSÖRÖF, POA PRATENSIS L.</p>
 <p>Cynosurus cristatus. Streif. Sammograss Cocksfoot</p>	 <p>LISIČJI REP <i>Alopecurus pratensis</i></p>	 <p>ZLATI OVSENEC <i>Trisetum flavescens</i></p>
PASJI REP <i>(Cynosurus cristatus)</i>	LISIČJI REP <i>(Alopecurus pratensis)</i>	



NAVADNA GLOTA
Brachypodium pinnatum




NAVADNI OBRAD
Bothriochloa ischaemum



DIŠEČA BOLJKA
Anthoxanthum odoratum



PUHASTA OVSIKA
Helictotrichon pubescens



NAVADNA MIGALICA
Briza media

Glede na kvaliteto delimo trave v naslednje skupine:

- **ZELO DOBRE TRAVE:** lisičji rep (*Alopecurus pratensis*), visoka pahovka (*Arrhenatherum elatius*), pasja trava (*Dactylis glomerata*), travniška bilnica (*Festuca pratensis*), trstikasta bilnica (*Festuca arundinacea*), travniški mačji rep (*Phleum pratense*), gola stoklasa (*Bromus inermis*), mnogocvetna ljuljka (*Lolium multiflorum*), zlati ovsenec (*Trisetum flavescens*), trpežna ljuljka (*Lolium perenne*), rdeča bilnica (*Festuca rubra*), travniška latovka (*Poa pratensis*), bela šopulja (*Agrostis alba*).
- **DOBRE DO SREDNJE DOBRE TRAVE** so trave, ki so bolj ali manj kakovostne, vendar imajo slabo proizvodno sposobnost (pasji rep (*Cynosorus cristatus*), latovke (*Poae*)), dobre do srednje

dobre trave, ki so produktivne in imajo sorazmerno veliko gospodarsko vrednost v manj ugodnih vremenskih razmerah (trstikasta bilnica (*Festuca arundinacea*)), nekatere trave, katerim z nadmorsko višino naraste kakovost (pokončna stoklasa (*Bromus erectus*), nežna šopulja (*Agrostis termis*)), kakovostne trave na travinju, če se razširijo na njive, pa postanejo pleveli (pirnica (*Agropyron repens*)), pesjak (*Cynodon dactylon*)), glede na rabo (pri paši zelo dobre, pri košnji slabše), kot je enoletna latovka (*Poa annua*) in še nekatere druge: sivozelena pirnica (*Agropyron intermedium*), navadna šopulja (*Agrostis vulgaris*), alpska latovka (*Poa alpina*), ozkolistna travniška latovka (*Poa pratensis var. angustifolia*).

- **SLABE IN BREZVREDNE TRAVE:** med slabe in brezvredne trave spadajo: pasja šopulja, kolenčasti lisičji rep, navadni obrad, dišeča boljka, navadna glota, puhasta ovsika, gozdna glota, srednja migalica, njivska stoklasa, grozdasta stoklasa, zlatolasi obrad itd.